

Guide d'élevage des pondeuses rousses

De la poussine à la réforme : poulette, entrée en ponte, lumière, eau, chaleur

Repères : Novogen Brown, ISA Brown



Sommaire

1. La pondeuse rousse NEXTEKCI
2. Le démarrage des poussines
3. L'élevage de la poulette
4. La lumière en climat chaud
5. L'entrée en ponte
6. La production d'œufs
7. L'eau et la chaleur
8. Santé, biosécurité et réforme

1. La pondeuse rousse NEXTEKCI

La pondeuse rousse pond des œufs à coquille brune pendant environ un an et demi de production. Les poussines NEXTEKCI suivent les mêmes courbes de croissance et de ponte que la souche de référence Novogen Brown. Elles sont vaccinées contre la maladie de Marek au couvoir (attestation sur demande).



Poussine pondeuse rousse NEXTEKCI au premier jour.

Les grandes étapes

Âge	Étape
0 à 5 semaines	Démarrage et poussinière
6 à 16 semaines	Croissance de la poulette
17 à 20 semaines	Préparation à la ponte, mise en place dans le bâtiment de ponte
20 à 22 semaines	Entrée en ponte
22 à 72-80 semaines	Production, puis réforme

Conseil : Une bonne pondeuse se prépare pendant l'élevage : une poulette au bon poids et bien homogène à 18 semaines pondra plus longtemps et plus régulièrement.

2. Le démarrage des poussines

- Préchauffer le bâtiment 30 à 40 heures avant l'arrivée : environ 35 °C dans la zone de démarrage, litière à 29-30 °C.
- Au sol, pas plus de 20 poussines par m² dans la partie chauffée au démarrage.
- Eau entre 20 et 25 °C à l'arrivée, aliment démarrage en miettes sur papier ou plateaux.
- Un poussin bien au chaud a une température de 40 à 41 °C : pattes tièdes, poussins actifs et bien répartis.

Source : Novogen Brown, guide d'élevage (2024)

Schéma : Lisez la position des poussines sous la chaleur. (à voir en couleur sur www.nextekci.com/ecole/guides/pondeuses-rousses) — D'après Cobb (Broiler Management Guide)

Le détail du démarrage (températures par âge, contrôles des jabots) dans le guide du poulet de chair : www.nextekci.com/ecole/guides/poulet-de-chair-blanc#démarrage

3. L'élevage de la poulette

Pesez une centaine de poulettes chaque semaine et comparez au tableau. Si le poids est en retard, ne baissez pas la lumière trop vite et vérifiez l'eau, la place à la mangeoire et la qualité de l'aliment.

Poids et aliment de la poulette

Âge	Aliment par jour	Poids visé
1 semaine	11 g	65 à 70 g
2 semaines	17 g	110 à 120 g
4 semaines	35 g	270 à 285 g
6 semaines	47 g	470 à 495 g
8 semaines	55 g	660 à 695 g
10 semaines	60 g	840 à 900 g
12 semaines	65 g	1 020 à 1 090 g
14 semaines	72 g	1 190 à 1 255 g
16 semaines	78 g	1 350 à 1 425 g
18 semaines	85 g	1 480 à 1 580 g

Source : Novogen Brown, guide d'élevage (2024), p. 38

Repères en climat chaud

- Densité au sol : environ 20 poulettes par m² jusqu'à 4 semaines, puis 10 par m² jusqu'à 17 semaines.
- Assez de mangeoires pour que toutes les poulettes mangent en même temps : c'est la clé de l'homogénéité.
- En élevage, l'aliment passe de démarrage à croissance, puis aliment poulette et aliment pré-ponte avant les premiers œufs.

Réf. Lohmann, climat chaud

4. La lumière en climat chaud

La lumière règle la maturité de la poule : on la diminue pendant l'élevage, puis on l'augmente pour lancer la ponte. Ne jamais augmenter la durée de lumière avant que les poulettes aient le bon poids, et ne jamais la diminuer pendant la ponte.

Programme lumineux pour les pays chauds (entre 20° Nord et 20° Sud)

Âge	Heures de lumière par jour	Poids visé
1re semaine	22 h puis 20 h	—
3 semaines	18 h	—
5 semaines	16 h	—
8 semaines	14 h 30	—
12 semaines	12 h 30	—
13 à 18 semaines	12 h (ou la durée du jour à partir de 14 semaines)	1 480 à 1 580 g à 18 semaines
19 semaines	+ 1 h	1 560 à 1 660 g
20 semaines	+ 1 h	1 625 à 1 730 g
21 semaines	+ 1 h	1 675 à 1 780 g
22 et 23 semaines	+ 30 min chaque semaine	1 715 à 1 840 g
24 semaines et plus	16 h	1 765 à 1 860 g

Source : Novogen Brown, guide d'élevage (2024), p. 13

Conseil : En bâtiment ouvert, la lumière du jour compte : la durée totale, c'est le jour naturel plus l'éclairage d'appoint (avant le lever ou après le coucher du soleil).

5. L'entrée en ponte

- Installer les poulettes dans le bâtiment de ponte vers 16 à 17 semaines, avant les premiers œufs.
- Passer à l'aliment pré-ponte, puis à l'aliment ponte (riche en calcium) dès les premiers œufs.
- Pondoirs en place, propres et garnis, avant le début de la ponte.
- Augmenter la lumière seulement si le poids est atteint (voir le tableau du chapitre 4).

Les premiers œufs arrivent vers 19 à 20 semaines ; la moitié des poules pondent vers 20 à 21 semaines.

6. La production d'œufs

Le tableau donne les objectifs de la souche dans de très bonnes conditions. En bâtiment ouvert, par forte chaleur, la ponte moyenne sur l'année est souvent plus basse (autour de 75 %) : suivez votre courbe chaque semaine pour réagir vite si la ponte chute.

Objectifs de production

Âge	Ponte (% des poules)	Poids moyen de l'œuf	Œufs cumulés par poule
20 semaines	15 %	48 g	1
22 semaines	69 %	53 g	9
25 semaines	94,5 %	57,6 g	28
30 semaines	96,5 %	60,5 g	61
40 semaines	95,7 %	62,9 g	127
50 semaines	93,8 %	63,9 g	192
60 semaines	90,4 %	64,5 g	254
72 semaines	84,7 %	65 g	318
80 semaines	80,9 %	65,4 g	362

Source : Novogen Brown, guide d'élevage (2024), p. 39-42

- Aliment ponte : environ 111 à 119 g par poule et par jour en pleine production.
- Ramasser les œufs au moins 2 à 3 fois par jour, plus souvent quand il fait chaud.
- Écarter les œufs cassés, fêlés ou sales ; stocker les œufs au frais et à l'ombre.

Source : Novogen Brown, guide d'élevage (2024)

Calculez le coût de revient d'un œuf avec vos propres prix : www.nextekci.com/calculateur-rentabilite-poulet

7. L'eau et la chaleur

Une poule boit environ 1,8 fois ce qu'elle mange, et presque le double quand il fait très chaud. Par forte chaleur, une eau fraîche (moins de 20 °C si possible) aide la poule à tenir sa ponte et la solidité de la coquille.

Eau bue par une poule en production

Température	Litres d'eau pour 1 kg d'aliment	Eau par poule et par jour
20 °C	1,8	205 ml
25 °C	2,1	230 ml
30 °C	3,1	320 ml

Source : Novogen Brown, guide d'élevage (2024) (d'après ITAVI 2012), p. 18

Contre la chaleur

- Au sol, environ 4 à 5 poules par m² quand il fait 30 °C.
- Plus d'abreuvoirs quand il fait chaud : environ 1 pipette pour 10 poules à 30 °C (1 pour 20 à 25 °C).
- Bâtiment orienté est-ouest, toit clair, bon débord de toit, air qui circule.
- Distribuer une partie de l'aliment aux heures fraîches.

Réf. Lohmann, climat chaud

Schéma : Le bâtiment ouvert amélioré garde la chaleur sous le toit et fait passer l'air au niveau des poules. (à voir en couleur sur www.nextekci.com/ecole/guides/pondeuses-rousses) — D'après Cobb (Broiler Management Guide)

8. Santé, biosécurité et réforme

Les poussines pondeuses NEXTEKCI sont vaccinées contre la maladie de Marek au couvoir. Les autres vaccins se font à la ferme pendant l'élevage de la poulette, selon le protocole du vétérinaire de votre zone : demandez-le avant l'arrivée des poussines.

- Une seule bande d'âge par bâtiment ; pédiluve, tenue réservée, peu de visiteurs.
- Lutte contre les rats et les insectes ; pas de volailles de basse-cour à côté.
- Suivre chaque jour : œufs ramassés, morts, aliment et eau consommés.
- Réforme vers 72 à 80 semaines : les poules de réforme se vendent, ce qui fait partie du revenu de la bande.

Commander vos poussines pondeuses : prix du jour sur WhatsApp : <https://wa.me/2250707727867>