

Guide du poussin d'un jour : du couvoir à la ferme

Choisir, commander, transporter et recevoir ses poussins : les bons gestes, du couvoir d'Agnibilékrou à la fin de la première semaine

Repères : Cobb (Broiler Management Guide) et leçons de l'École NEXTEKCI · couvoir NEXTEKCI d'Agnibilékrou



Sommaire

1. Le travail du couvoir en bref
2. Les six poussins NEXTEKCI
3. Reconnaître un bon poussin
4. Commander ses poussins
5. Le transport : trois axes, et partout en Côte d'Ivoire
6. Bien transporter les poussins
7. Préparer la réception
8. La réception, étape par étape
9. Les 72 premières heures
10. La mortalité de la première semaine

11. La vaccination
12. Commander et se faire conseiller

1. Le travail du couvoir en bref

Chez la poule, l'incubation dure 21 jours. Le travail du couvoir consiste à réunir, pendant ces 21 jours, les conditions d'une bonne couveuse (chaleur, humidité, retournement des œufs), puis à trier, compter et emballer les poussins pour qu'ils partent dans les meilleures conditions.

De l'œuf au carton

1. Les œufs à couvrir : ils sont sélectionnés avant d'entrer en incubation (propres, entiers, de forme et de taille régulières).
2. L'incubation : pendant 21 jours, la température, l'humidité et le retournement des œufs sont contrôlés en permanence.
3. L'éclosion : juste avant de sortir de l'œuf, le poussin absorbe le reste de son jaune. Cette réserve le nourrit pendant ses premières heures et pendant le voyage.
4. Le tri manuel : chaque poussin est trié à la main ; seuls les poussins vifs et bien formés partent.
5. Le comptage et l'emballage : les poussins sont placés en cartons aérés de 50, identifiés par type de poussin et par date.
6. Le départ : retrait au couvoir, ou départ le soir avec les transporteurs professionnels, pour voyager aux heures fraîches.



Œufs à couvrir sélectionnés avant l'incubation, au couvoir NEXTEKCI d'Agnibilékrou.



La salle d'incubation : température, humidité et retournement des œufs contrôlés jusqu'à l'éclosion.



Le tri manuel à l'éclosion : tenue de travail dédiée, charlotte et masque pour manipuler les poussins.

Conseil : Le poussin d'un jour n'a encore ni mangé ni bu : il vit sur la réserve de son jaune. Elle suffit pour le voyage, à condition qu'il ne souffre ni de la chaleur, ni du froid, ni du manque d'air. À l'arrivée, plus vite il boit, mieux il démarre.

2. Les six poussins NEXTEKCI

Le couvoir d'Agnibilékrou produit six types de poussins d'un jour, vendus par cartons de 50. Le bon choix dépend de votre marché, de votre bâtiment et du temps que vous pouvez attendre avant la vente.

Chair blanc

- Poulet de chair à croissance rapide (type Cobb 500)
- Vente vers 35 à 45 jours
- Demande un bâtiment bien conduit, un aliment complet et un acheteur prêt



Chair roux

- Poulet de couleur robuste, souvent appelé « poulet rouge »
- Supporte mieux la chaleur
- Cycle plus long que le chair blanc, chair ferme appréciée



Gris barré

- Poulet de couleur foncé, très rustique
- Adapté à la semi-liberté et aux bâtiments simples
- Cycle plus long que le chair blanc



Hybride

- Équilibre entre croissance et robustesse
- Chair ferme
- Cycle plus long que le chair blanc



Coquelet blanc

- Mâles de souche pondeuse
- Option économique pour débiter
- Plus léger qu'un poulet de chair : viser le bon client



Pondeuse rousse


- Pour la production d'œufs
- Vaccinée contre la maladie de Marek au couvoir
- Cycle long : plusieurs mois d'élevage avant les premiers œufs



Conseil : Pour une première bande, choisissez un métier qui pardonne : un poulet de couleur ou un coquelet permet d'apprendre avec un risque limité. Un conseiller vous aide à choisir sur WhatsApp au +225 05 44 83 27 79.

3. Reconnaître un bon poussin

Un bon poussin se reconnaît en quelques secondes, à l'ouverture du carton. Regardez d'abord le lot dans son ensemble, puis prenez quelques poussins en main, dans plusieurs cartons.



À gauche, un bon poussin : vif, duvet sec, nombril bien fermé, pattes droites. À droite, un poussin faible. — Illustration NEXTEKCI



Poussins d'un jour au couvoir NEXTEKCI d'Agnibilékrou.

Les critères d'un bon poussin

Critère	Bon poussin	À signaler
Activité	Vif, debout, attentif, réagit au bruit et à la lumière	Couché, endormi, ne se relève pas quand on le pose
Yeux	Ronds, brillants, bien ouverts	Mi-clos, ternes
Nombril	Bien fermé, sec, recouvert de duvet	Ouvert, humide, noirci, ou avec un reste qui dépasse
Pattes	Brillantes et cireuses au toucher, droites ; jarrets sans rougeur	Sèches et ridées (poussin qui a soif), jarrets rouges, doigts tordus
Duvet	Sec, long, propre et gonflant	Collé, sale ou mouillé
Forme	Corps bien formé, bec et cou droits	Bec croisé, cou tordu, pattes tordues

Source : Cobb (Broiler Management Guide)

Le contrôle à l'ouverture des cartons

- Écouter : un lot en forme piaille doucement et régulièrement.
- Regarder : les poussins se lèvent, se dispersent et explorent dès qu'ils sont posés.
- Prendre en main quelques poussins de plusieurs cartons : yeux, nombril, pattes, duvet.
- Peser un échantillon (environ 5 % des cartons) pour connaître le poids de départ : c'est la référence pour juger le poids au jour 7.
- Noter tout de suite les poussins morts ou faibles à l'ouverture.

Conseil : Un lot bien trié est homogène : des poussins de même taille démarrent ensemble et grandissent ensemble. Si quelque chose vous inquiète à l'ouverture des cartons, prenez des photos et une courte vidéo et envoyez-les le jour même au +225 05 44 83 27 79.

4. Commander ses poussins

La date s'adapte au bâtiment, pas l'inverse. Commandez quand vous savez que votre bâtiment sera nettoyé, désinfecté, sec et équipé la veille de l'arrivée, et que vos acheteurs seront prêts à l'âge de vente.

Les repères de la commande

Question	Réponse
Comment commander ?	Sur WhatsApp au +225 07 07 72 78 67
Quelles informations donner ?	Le type de poussin, la quantité en cartons de 50, votre ville ou votre point de retrait, la date souhaitée
Combien au minimum ?	50 poussins (1 carton) pour un retrait au couvoir d'Agnibilékrou ; 200 poussins (4 cartons) pour une livraison par transporteur
Quand commander ?	Au moins 15 jours avant le départ ; 3 à 4 semaines à l'avance en période de forte demande, notamment avant les fêtes
Quels jours partent les poussins ?	Le lundi et le jeudi soir, pour une arrivée le mardi et le vendredi matin sur les axes
Et le prix ?	Le prix du jour est confirmé par un conseiller à la commande ; le règlement à l'avance valide votre place au planning

Combien de poussins commander ?

- Selon la surface du bâtiment : ne dépassez pas la densité conseillée pour votre production (voir le guide du bâtiment).
- Selon vos acheteurs : une bande de chair blanc doit être vendue à l'âge prévu, car chaque jour de retard coûte de l'aliment.
- Selon votre trésorerie : prévoyez l'aliment, le chauffage, la litière et le vétérinaire pour toute la bande, pas seulement l'achat des poussins.
- Pour une première bande, commencez petit : on apprend mieux le métier sur 200 à 500 sujets.

Conseil : Avant de confirmer, prévoyez le véhicule, la personne qui réceptionne et un numéro joignable la nuit du départ : la coordination avec le transporteur se fait par WhatsApp.

Le guide du bâtiment et de l'équipement : densités et matériel :
www.nextekci.com/ecole/guides/batiment-et-equipement-d-elevage

5. Le transport : trois axes, et partout en Côte d'Ivoire

NEXTEKCI ne transporte pas lui-même ses poussins. Des transporteurs professionnels roulent sur trois axes fixes au départ d'Agnibilékrou. Le transporteur vous indique son tarif par carton, que vous lui réglez directement.

Les trois axes

Axe	Itinéraire
Axe 1	Agnibilékrou -> Daoukro -> Bouaké
Axe 2	Agnibilékrou -> Bongouanou -> Dimbokro -> Yamoussoukro -> Bouaflé -> Daloa
Axe 3	Agnibilékrou -> Abengourou -> Akoupé -> Adzopé -> Abidjan (Yopougon)

Les poussins NEXTEKCI sont disponibles dans toute la Côte d'Ivoire. Si votre ville n'est pas sur un axe, vous avez trois solutions :

- Le retrait au couvoir d'Agnibilékrou, dès 50 poussins.
- Le retrait à l'arrivée de l'axe le plus proche, au point convenu avec le transporteur.
- Votre propre transporteur, qui vient chercher les poussins au couvoir ou à l'arrivée d'un axe.

Où récupérer ses poussins, selon votre région

Région	Exemples de villes	Point de retrait
Est, d'Agnibilékrou à Bouna et au-delà	Koun-Fao, Tanda, Bondoukou, Nassian, Bouna	Au couvoir d'Agnibilékrou
Nord	Korhogo, Ferkessedougou, Odienné, Katiola	Axe 1 à Bouaké
Centre-Est	Prikro, M'Bahiakro, Bocanda	Axe 1 à Daoukro
Centre	Toumodi, Tiébissou, Sinfra, Oumé	Axe 2 à Yamoussoukro ou Bouaflé
Ouest et Centre-Ouest	Man, Duékoué, Séguéla, Gagnoa	Axe 2 à Daloa
Sud et littoral	San-Pédro, Divo, Agboville, Grand-Bassam, Aboisso	Axe 3 à Abidjan (Yopougon)



Cartons aérés de 50 poussins, identifiés par type de poussin et par date, prêts pour le retrait ou le transport.

Conseil : Restez joignable la nuit du départ et le matin de l'arrivée : le transporteur ne peut pas attendre. Soyez au point de retrait avant l'heure prévue, avec un véhicule prêt et un coin d'ombre pour les cartons.

Voir les axes, les villes et les points de retrait : www.nextekci.com/livraison

6. Bien transporter les poussins

Le voyage est le moment le plus fragile de la vie du poussin. Il supporte quelques heures sans manger ni boire grâce à son jaune, mais il ne supporte ni la chaleur, ni le froid, ni le manque d'air. Ces règles valent pour le transporteur comme pour le trajet entre le point de retrait et votre ferme.



Transport : cartons percés, piles espacées, véhicule couvert et aéré, jamais au soleil. — Illustration NEXTEKCI

Les règles du transport

La règle	Pourquoi
Véhicule couvert et aéré, jamais un coffre fermé	Les poussins dégagent beaucoup de chaleur : sans air, ils étouffent
Jamais au soleil, ni sur le toit d'un véhicule	Le soleil chauffe les cartons en quelques minutes ; la pluie et le vent les refroidissent
De l'air entre les cartons, aucune bâche fermée par-dessus	Les trous des cartons doivent rester dégagés pour que l'air circule
Pas d'arrêt prolongé, surtout en plein soleil	Dans un véhicule à l'arrêt, l'air ne circule plus et la chaleur monte vite
Voyager aux heures fraîches et aller directement à la ferme	C'est pour cela que les départs se font le soir ; chaque heure perdue retarde la première eau
Pas de gaz d'échappement ni de fumée près des cartons	Les poussins y sont très sensibles
Ni eau ni aliment pendant le trajet	Le poussin vit sur son jaune ; de l'eau renversée dans le carton le mouille et le refroidit
Cartons calés à plat, conduite en douceur	Un carton qui glisse ou se renverse blesse et entasse les poussins

Pendant le trajet, écoutez et regardez

- Poussins qui piaillent fort et se tassent : ils ont froid. Fermez les ouvertures exposées au vent, sans priver les cartons d'air.
- Poussins silencieux, bec ouvert, ailes écartées : ils ont trop chaud. Aérez tout de suite, mettez à l'ombre, écartez les cartons.
- Poussins calmes qui piaillent doucement : tout va bien.

Conseil : Le piège classique : laisser les cartons au soleil au point de retrait pendant qu'on cherche un véhicule. Venez avec le véhicule prêt, et mettez les cartons à l'ombre dès qu'ils sont déchargés.

7. Préparer la réception

Les poussins doivent arriver dans un bâtiment déjà prêt : propre, désinfecté, sec et chaud. Le jour de l'arrivée, il est trop tard pour réchauffer un sol froid. Jusqu'à 5 jours, le poussin ne sait pas régler sa température : c'est le sol et l'air que vous préparez qui le gardent au chaud.

Le compte à rebours

1. Entre deux bandes : nettoyage, désinfection et vide sanitaire terminés, bâtiment sec.
2. Quelques jours avant : litière propre et sèche en place, garde (cercle de démarrage) installée autour de la source de chaleur, matériel vérifié, aliment démarrage en stock.
3. Au moins 48 heures avant : allumer le chauffage, pour que le sol, l'air et l'humidité soient stables 24 heures avant l'arrivée.
4. La veille : vérifier la température à hauteur de poussin (32 à 34 °C sous le bord de l'éleveuse) et la chaleur du sol.
5. Deux heures avant : remplir les abreuvoirs d'eau propre, à la température de la pièce, jamais glacée ; mettre en place plateaux et papier.
6. À l'arrivée : lumière douce, et une personne prête pour décharger, compter et noter.

Le matériel de démarrage

Point	Repère
Abreuvoirs	14 à 16 pour 1 000 poussins, dont des mini-abreuvoirs les premiers jours
Plateaux ou papier	1 plateau pour 50 poussins ; sur papier, environ 50 à 65 g d'aliment par poussin
Température du sol	Au moins 32 °C ; environ 40 °C juste sous les éleveuses
Courants d'air	Aucun au niveau des poussins jusqu'à 14 jours
Aliment et eau	Jamais directement sous la source de chaleur

Source : Cobb (Broiler Management Guide)

Conseil : Ne fermez jamais complètement un bâtiment chauffé au gaz ou au charbon : ils consomment l'oxygène et dégagent des gaz. Gardez toujours une ouverture haute pour renouveler l'air.

Préparer le bâtiment pas à pas : le guide du bâtiment et de l'équipement :
www.nextekci.com/ecole/guides/batiment-et-equipement-d-elevage

8. La réception, étape par étape

Du point de retrait à la première eau

1. Au point de retrait : vérifier le nombre de cartons et l'étiquetage du lot (type, date). Mettre les cartons à l'ombre et partir tout de suite.
2. À la ferme : porter les cartons directement dans le bâtiment chauffé ; ne jamais les laisser dehors.
3. Ouvrir les cartons calmement, un par un, à l'intérieur de la garde, en lumière douce.
4. Poser les poussins doucement près de l'eau, bien répartis dans la zone de démarrage ; ne pas vider les cartons en tas.
5. Compter et noter tout de suite sur la fiche : poussins reçus, morts à l'arrivée, faibles mis à part.
6. L'eau d'abord : tremper le bec de quelques poussins dans l'abreuvoir, les autres suivent.
7. L'aliment démarrage (miettes fines) une à deux heures après, sur les plateaux et le papier.
8. Remettre la lumière normale une fois tous les poussins posés, puis contrôler tout le matériel 1 à 2 heures après.



La réception : poser les poussins doucement dans le cercle chauffé, près de l'eau et de l'aliment. — Illustration NEXTEKCI

Les erreurs à éviter

- Donner de l'eau glacée « pour les rafraîchir » : les poussins ne boivent pas et se refroidissent.
- Ouvrir les cartons dehors, au soleil ou au vent.
- Laisser les cartons fermés dans le bâtiment pendant qu'on finit de préparer.
- Donner un antibiotique « pour prévenir » : aucun traitement sans avis du vétérinaire.

Un peu de sucre dissous dans l'eau les premières heures (environ deux cuillères à soupe par litre) aide les poussins à récupérer du voyage. Vitamines ou anti-stress : seulement sur le conseil de votre vétérinaire ou de votre encadrant, jamais au hasard.

Conseil : Un problème à l'arrivée ? Envoyez des photos et une courte vidéo sur WhatsApp au +225 05 44 83 27 79 le jour même. Le suivi technique NEXTEKCI accompagne les 72 heures qui suivent la livraison.

9. Les 72 premières heures

Les trois premiers jours décident de la bande. Un poussin qui boit, mange et dort au chaud dès la première nuit devient un poulet régulier ; un poussin qui a eu froid, soif ou peur garde un retard que rien ne rattrape tout à fait.

Schéma : Regardez vos poussins 1 à 2 heures après l'arrivée, puis toutes les deux heures la première nuit : leur position dit si la chaleur est bonne. (à voir en couleur sur www.nextekci.com/ecole/guides/poussin-d-un-jour-du-couvoir-a-la-ferme) — D'après Cobb (Broiler Management Guide)

Lire la répartition

Ce que vous voyez	Ce que ça veut dire	Ce que vous faites
Poussins tassés en boule sous la chaleur, qui piaillent fort	Ils ont froid	Baisser l'éleveuse ou augmenter la chaleur, fermer les bâches, chasser les courants d'air
Poussins collés aux bords de la garde, loin de la chaleur, bec ouvert, ailes écartées	Ils ont trop chaud	Remonter l'éleveuse ou baisser la chaleur, aérer
Poussins tous d'un côté	Un courant d'air vient de l'autre côté	Trouver et fermer la source du courant d'air
Poussins répartis partout, qui bougent, boivent, mangent, piaillent doucement	Tout va bien	Ne rien changer, noter l'heure et la température

Les contrôles des premiers jours

Quand	Le contrôle	Bon résultat
4 à 6 heures après l'arrivée	Poser les pattes de quelques poussins contre votre cou ou votre joue	Pattes tièdes ; pattes froides = sol trop froid
8 heures après l'arrivée	Tâter le jabot de 20 poussins pris à plusieurs endroits	Au moins 8 sur 10 pleins et souples
24 heures après l'arrivée	Même contrôle du jabot	Plus de 9 sur 10 pleins et souples (Cobb vise 95 %)
Jour 7	Peser un échantillon	Un chair blanc bien démarré pèse environ 4 fois son poids d'arrivée

Repères : leçons de l'École NEXTEKCI et Cobb (Broiler Management Guide)

Lire le jabot

- Jabot plein et souple : le poussin a bu et mangé. Parfait.
- Jabot plein et dur : il a mangé mais pas assez bu. Rapprochez les abreuvoirs, vérifiez la température de l'eau.
- Jabot vide : il n'a trouvé ni l'eau ni l'aliment. Vérifiez la lumière, le nombre de plateaux, la hauteur des abreuvoirs, la chaleur.

La température à hauteur de poussin

Âge	Sous l'éleveuse	Dans le reste de la zone
Jours 1 à 3	32 à 34 °C	28 à 30 °C
Jours 4 à 7	30 à 32 °C	27 à 29 °C
Jours 8 à 14	28 à 30 °C	26 à 28 °C
Après 14 jours	Baisse de 2 à 3 °C par semaine	Jusqu'à la température extérieure

Repères : leçons de l'École NEXTEKCI (niveaux 1 et 2)

La nuit, les faibles, la fiche

- La première nuit, quelqu'un dort près du bâtiment et passe toutes les deux heures : température, répartition, eau, gaz ou courant.
- Les deux nuits suivantes, un passage à minuit et un au petit matin suffisent si tout va bien.
- Les poussins faibles sont mis dans un petit espace à part, au chaud, avec eau et aliment à portée.
- L'eau est renouvelée plusieurs fois par jour ; l'aliment est donné en petites quantités fréquentes, pour rester frais.
- Sur la fiche, chaque jour : température matin et soir, eau consommée, aliment distribué, morts, faibles, observations.

Conseil : Regardez toujours les poussins avant de lire le thermomètre : le thermomètre donne un chiffre, les poussins donnent la vérité. Une panne de chaleur à 2 heures du matin, découverte à 6 heures, coûte des poussins étouffés en tas.

10. La mortalité de la première semaine

Quelques pertes la première semaine sont normales : voyage, poussins faibles, démarrage. L'important n'est pas d'avoir zéro mort, c'est de voir un dépassement le jour même. Le pourcentage se calcule sur le nombre de poussins reçus : 15 morts sur 1 000 poussins = 1,5 %.

Normale ou anormale

Repère	Normal	Alerte
Première semaine, au total	1 à 1,5 % (voyage, démarrage, poussins faibles)	Plus de 2 % au total à 7 jours
Un seul jour, après le jour 1	Quelques morts isolés	Plus de 1 % en un jour
Jabots à 24 heures	Plus de 9 poussins sur 10 avec le jabot plein et souple	Jabot vide chez plus d'un poussin sur 5

Repères : leçons de l'École NEXTEKCI (niveaux 1 et 2)

Les causes les plus fréquentes

Ce que vous voyez	Cause probable	Que faire
Poussins faibles aux pattes sèches et ridées, morts les premiers jours	Voyage trop chaud ou trop long, première eau trop tardive	Eau tout de suite ; vérifier que tous les poussins trouvent les abreuvoirs
Poussins morts écrasés en tas, le matin	Froid ou panne de chaleur la nuit	Surveillance de nuit, chauffage vérifié, courants d'air fermés
Poussins collés aux bords, bec ouvert, morts aux heures chaudes	Trop chaud	Remonter l'éleveuse ou baisser la chaleur, aérer
Poussins chétifs, jabot vide	Ils n'ont pas trouvé l'eau ou l'aliment	Plus de plateaux, abreuvoirs à bonne hauteur, lumière suffisante
Nombriil enflammé ou humide, mortalité qui traîne	Infection possible	Appeler le vétérinaire : traitement seulement sur sa prescription
Fientes rouges ou très liquides chez beaucoup de poussins	Problème sanitaire possible	Appeler le vétérinaire le jour même

Appelez le vétérinaire de votre zone ou le conseiller NEXTEKCI dès que

- La mortalité dépasse 1 % en un jour, après le premier jour.
- Les poussins restent abattus malgré une bonne chaleur.
- Les fientes sont rouges ou très liquides chez beaucoup de poussins.
- Le jabot reste vide chez plus d'un poussin sur 5 à 24 heures.

Conseil : Notez dès le premier jour le nombre reçu, les morts à l'arrivée et les morts de chaque jour : ces chiffres sont le point zéro de votre bande. Avec des photos et une courte vidéo, ils permettent un avis rapide. Attendre un jour de plus n'a jamais aidé.

11. La vaccination

Les pondeuses rousses sont vaccinées contre la maladie de Marek au couvoir (attestation sur demande). Les autres poussins (chair blanc, chair roux, gris barré, hybride, coquelet) ne reçoivent aucun vaccin au couvoir : la vaccination se fait à la ferme, selon le protocole du vétérinaire de votre zone.

Ce que cela veut dire pour vous

- Choisissez le vétérinaire de votre zone avant l'arrivée des poussins : c'est lui qui fixe le protocole de vaccination de votre ferme.
- Pour les pondeuses rousses, demandez l'attestation de vaccination contre la maladie de Marek et gardez-la avec la fiche de la bande.
- Un vaccin se garde au froid, entre 2 et 8 °C, jamais au soleil ; le flacon ouvert s'utilise tout de suite.
- Notez chaque vaccin sur la fiche : nom, numéro de lot, date, nombre d'oiseaux, qui l'a fait.

Conseil : Un vaccin ne protège bien qu'une bande bien conduite : chaleur, eau propre, litière sèche et biosécurité restent la première protection de vos poussins.

Le guide de santé et de biosécurité des volailles : www.nextekci.com/ecole/guides/sante-et-biosecurite-des-volailles

12. Commander et se faire conseiller

Les contacts NEXTEKCI

Pour	Contact
Commander des poussins	WhatsApp +225 07 07 72 78 67
Une question technique, un souci à l'arrivée	WhatsApp +225 05 44 83 27 79
Retirer au couvoir	Couvoir NEXTEKCI, Agnibilékrou
Horaires	Du lundi au samedi, 9 h – 12 h et 14 h – 18 h ; le dimanche, 9 h – 12 h
Maria, l'assistante en ligne	À toute heure sur www.nextekci.com

Commander vos poussins sur WhatsApp : <https://wa.me/2250707727867>

Voir les axes et les points de retrait : www.nextekci.com/livraison

Poser une question technique à un conseiller : <https://wa.me/2250544832779>